



"وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ"

موجات المينا Tsunamis

ومدى تأثيرها على الوطن العربي

أ.د. عبدالله بن محمد العمري

قسم الجيولوجيا - كلية العلوم - جامعة الملك سعود

سلسلة إصدارات جيولوجية ثقافية ٤

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م



المقدمة

التسونامي ظاهرة طبيعية وتعتبر من أشد الظواهر فتكا عبر التاريخ قديماً وحديثاً ومن أعنفها خلال القرن الحالي تسونامي جزر شرق الويسيان في أبريل ١٩٤٦ حيث بلغ ارتفاع الموجة ٣٥ م وتسونامي نيكاراغوا في سبتمبر ١٩٩٢ حيث أغرق توجة ارتفاعها ١٠٠ متر ١٧٠ شخصاً. وتسونامي أوكي شيري اليابانية في ديسمبر ١٩٩٣ حيث وصل ارتفاع الموجة إلى ٣١ م وكذلك تسونامي بابوا غينيا الجديدة في يوليو ١٩٩٨ بارتفاع بلغ ١٥ م و ٥٠٠٠ قتيل غير أن التسونامي الذي ضرب جزيرة سومطره والهند وسريلانكا في ديسمبر ٢٠٠٤ يعد الأعنف خلال الأربعين سنة الماضية وأودى بحياة أكثر من ٢٨٠٠٠ شخص. ويرى الخبراء أن ٨٠٪ من موجات تسونامي تسجل في المحيط الهادئ و ١٠٪ في المحيط الهندي وبين ٥٪ إلى ١٠٪ في البحر الأبيض المتوسط (١).

تعتبر ظاهرة التسونامي من أشد الظواهر الطبيعية فتكاً عبر التاريخ وتتولد من حركة الدفع الفجائية التي يحدثها الزلزال تحت قاع المحيط نتيجة حركة تصدعية عنيفة من جراء تصدام صفيحتين، وفي بعض الحالات قد تنجم عن ثوران بركاني أو سقوط نيزك أو حدوث انزلاق أرضي تحت الماء. تتميز بمدى طويل جداً قادرة على نقل الطاقة المدمّرة من مصدرها في المحيط إلى مسافة تبلغ آلاف الكيلومترات. تمر التسونامي أثناء نشوئها بثلاث مراحل: التولد - الانتشار - الغرق. تتمثل عملية توليد الموجة بأي إزاحة عمودية مفاجئة في قاع البحر نتيجة حركة تصدعية عنيفة، حيث تقوم هذه الحركة بدفع ما فوقها من مياه نحو الأعلى. تنتشر عبر مياه المحيط بسرعة عالية تصل إلى ٧٠٠ كم/س غير أن ميل هذه الأمواج التي يصل طولها إلى ٦٠٠ ضعف ارتفاعها يكون من الصعوبة ملاحظتها في عرض البحر.



إن الظروف الحركية والبيئية التي تتشكل فيها التسونامي لا تتوفر في المنطقة العربية، حيث أن ذلك يتطلب أولاً أن تكون منطقة بحار أو محيطات مفتوحة بآلاف الكيلومترات بالإضافة إلى أن مناطق التسونامي النشطة تتولد من تصادم صفيحتين بشكل فجائي ورأسى. هذه الظروف لا تتوفر في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط والخليج العربي نظراً لحدودية اتساعهم علاوة على أن الفوالق في البحر الأحمر و خليج العقبة من النوع الرأسى والمضربي ليس لديها القدرة الكافية على توليد موجات تسونامية مدمرة كما هو الحال في المحيطين الهادى والهندى. لم يسبق تاريخياً أنه سجل أي موجات تسونامية منذ ٥٢٥ ق.م في شبه الجزيرة العربية بينما تم تسجيل تسع تسوناميات في منطقة البحر الأبيض المتوسط منذ ذلك التاريخ.

ماهية التسونامي

إن كلمة تسونامي **Tsu-nami** مصطلح ياباني مكون من كلمتين: "تسو" ومعناها "ميناء" و "نامي" و معناها "موجة" ويعني حرفيًا موجة الميناء **Harbor Wave** ربما لأنها تتسارع بصمت عبر المحيط دون أن يشعر بها أحد لتظهر فجأة أمواج عالية مدمرة. وقد استخدمها اليابانيون القدامى للتفرقة بين موجة المياه العاتية التي تدمر موانئ الصيد وموجات المياه العادية.


وتتجدر الإشارة أنه يجب التمييز أولاً بين ظاهرة التسونامي والأمواج المتولدة من الرياح أو من المد والجزر. فالرياح الخفيفة تؤدي إلى تجدد سطح المحيط على شكل أمواج قصيرة وقد يصل ارتفاعها إلى ٣٠ م في عرض المحيط ولكن حتى



موجات المد ونهايتها على الوطن العربي

هذه الأمواج العالية ليست قادرة على تحريك المياه العميقة. أما أمواج المد والجزر فإنها تولد من قوة الشد الناجمة عن جاذبية القمر أو الشمس التي تزحف مرتين يومياً حول الكوكبة الأرضية فهي تولد أيضاً تيارات مائية تصل إلى قاع المحيط كما تفعل التسونامييات.

أما التسونامييات فإنها تولد من حركة الدفع الفجائية التي يحدثها الزلزال تحت قاع المحيط نتيجة حركة تصدعية عنيفة من جراء تصادم صفيحتين. وفي بعض الحالات قد تنجم عن ثوران بركاني (جزيرة كراكاتوا الأندونيسية عام 1883 م) أو سقوط نيزك أو حدوث انزلاق أرضي تحت الماء.



التسونامييات المدمرة خلال ربع القرن الماضي (1990 - 2005 م) ، ويتبين أن تسونامي سومطرة - الذي وقع في ديسمبر 2004 م كان الأعنف والأكثر دماراً (1).



وتحدد حجم أضرار أمواج التسونامي عدة عوامل أهمها:

- ♦ **وقوع السواحل في محيط دائرة تحرك موجات التسونامي والتي لا تفقد الكثير من طاقتها مع التحرك نتيجة لطولها الموجي الكبير.**
- ♦ **الوضع الجغرافي للمنطقة الساحلية من ناحية ارتفاعها عن سطح البحر وكذلك تعامده مع اتجاه حركة الأمواج.**

وعلاوة إلى ما تلحقه هذه الأمواج من خسائر في الأرواح والمنشآت إلا أن أضرار هائلة تلحق ببيئة المناطق الساحلية قد تحتاج إلى عشرات السنين لاستعادة طبيعتها. والواقع أن عدم توفر احتمالات حدوث كارثة ما لا يعد مبرراً عقلانياً لتجاهل المخاطر التي قد تترتب عليها إذا ما وقعت.

المد والجزر	الرياح	التسونامي	الخاصية
أكبر من ١٠٠٠ كم	١٥٠ متر تقريباً	٢٠٠ كم تقريباً	طول الموجة
أكبر من ١٠٠٠ كم/الساعة	٦٠ كم/الساعة	٦٠٠ كم/الساعة تقريباً	السرعة
متغير	عدة أمتار	نصف متر	الارتفاع
١٢ ساعة	١٠ ثوان	٢٠ دقيقة	الفترة




مناطق التسونامي حول العالم ويلاحظ انتشارها حول حزام حلقة النار



ميكانيكية ظاهرة التسونامي

تتميز أمواج التسونامي العملاقة بمدى طويل جداً فهي قادرة على نقل الطاقة المدمرة من مصدرها في المحيط إلى مسافة تبلغ آلاف الكيلومترات. حيث تندفع في أعماق المحيطات بسرعة تزيد على 700 كم في الساعة وعلى الرغم من سرعتها فإنها لا تشكل خطراً في المياه العميقة. فالموجة الواحدة منها لا يزيد ارتفاعها عادة عن متر واحد في وسط المحيط في حين يصل ارتفاعها إلى أكثر من 10 أمتار عند اصطدامها بالشواطئ.


ويتمكن حساب سرعة الموجات التسونامية من الجذر التربيعي لقيمة العجلة الأرضية مضروبة في عمق الماء. فإذا كان عمق الماء 50 م كم فإن السرعة تساوي 200 كم/س. أما طول موجة التسونامي فتبلغ 213 كم إذا كانت الفترة الدورية 15 دقيقة. أي أنه كلما كانت المياه أكثر عمقاً وكانت الموجة أكثر طولاً كانت الموجة التسونامية ذات سرعة أكبر.



العلاقة بين طول الموجة والسرعة وعمق الماء عند حدوث التسونامي




تمر التسونامي أثناء نشوئها بثلاث مراحل فизيائية متتابعة: التولد والانتشار ثم الغرق. تتمثل عملية توليد الموجة بأي إزاحة عمودية مفاجئة في قاع البحر نتيجة حركة تصدعية عنيفة. حيث تقوم هذه الحركة بدفع ما فوقها من مياه نحو الأعلى. تنتشر عبر مياه المحيط بسرعة عالية تصل إلى 700 كم/س غير أن ميل هذه الأمواج التي يصل طولها إلى 600 ضعف ارتفاعها يكون من الصعوبة ملاحظتها في عرض البحر. أي أنه كلما كانت المياه أكثر عمقاً وكانت الموجة أكثر طولاً كانت الموجة التسونامية ذات سرعة أكبر. وعندما تصل الموجة إلى المياه الضحلة تتباين سرعتها حتى تصل إلى 80 كم/س تقريباً. وتؤدي ظاهرة انكسار الموجة وتضليلها إلى حشد طاقة الموجة وتركيزها ومن ثم تبدأ تنضغط طاقة الموجة داخل حجم أصغر أثناء دخولها إلى المياه الضحلة وتتباين لتلحق بها الموجة التي تليها أو أنها تلتف حول الشاطئ وتؤدي هذه الزيادة في كثافة الطاقة بدورها إلى زيادة في ارتفاع الموجة والتيارات.



Tsunamis

موجات المد والجزر تأثيرها على الوطن العربي



الثلاث مراحل لنشأة التسونامي : التولد والانتشار والإغراق. يؤدي الاتكسار والتضليل إلى حشد طاقة الموجة وتركيزها، لتصبح حائطاً عالياً وخطيراً من المياه (الخطوط المنقطة) أثناء دخولها إلى المياه الضحلة (١).



في أحيان أخرى يؤدي الانكسار **shoaling** والتضحل **refraction** إلى حشد طاقة الموجة وتركيزها ، لتصبح حائطاً عالياً وخطيراً من المياه. تنضغط طاقة الموجة داخل حجم أصغر (الخطوط المنقطة) أثناء دخولها إلى المياه الضحلة. وتتباين تلتحق بها الموجة التي تليها، أو أنها تلف حول أي لسان أو أرض متقدمة (٢).

وتبدأ خطورة هذه الموجات عند دخولها منطقة المياه الضحلة عند الموانئ والخلجان الضيقة حيث تصطدم بمستوى عمق المياه في هذه المناطق مما ينتج عنه انخفاض مفاجئ في سرعتها ، وتسبب عملية الانخفاض المفاجئ هذه إلى حدوث زيادة وفيرة في كمية المياه فيزداد معها ارتفاع الموجة بشكل ضخم ومرهق ، وتتسبب هذه القوة الضخمة الهدامة في إحداث دمار شديد عند ارتطامها بالشاطئ ، وعادة ما تتعرض المباني الكبيرة والمنازل في هذه المناطق لأنهياد عند ارتطام مثل هذه الموجات بها ، وكثيراً ما تحمل هذه الموجات التسونامية البوادر الكبيرة وترفعها ثم تجرفها نحو الأرض اليابسة لتستقر بعد ذلك فوق رمال الشاطئ.


تسونامي سومطرة

لم يشهد العالم منذ العام ١٩٦٤ زلزالاً يضاهي قوة الزلزال العنيف الذي ضرب دول جنوبية شرقية آسيا وهي إندونيسيا وسريلانكا والهند وتايلاند وมาيلزيا وجزر المالديف وأودي بحياة ٢٨٠٠٠ شخص ويعد خامس أقوى زلزال منذ العام ١٩٠٠ م.



لقد تعرضت غرب جزيرة سومطرة بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠٠٤ م إلى زلزال مدمر نجم عن موجات بحرية عاتية تجاوز قدره ٩ درجات. دلت الدراسات أن فترة هذه الزلزال استمرت ١٠ دقائق على الأقل وتعتبر الأطول في التاريخ الحديث.

وقع مركز الزلزال السطحي عند 3.316°N , 95.854°E إلى الغرب من القسم الشمالي من جزيرة سومطرة الاندونيسية وعلى بعد ٢٥٠ كيلومترا من الساحل الجنوبي الشرقي لباندا اتشيه و ٣٢٠ كيلومترا إلى الغرب من مدينة ميدان عند نهاية الحافة الغربية "لحقة النار" (Fire Belt) التي يتركز فيها ٨١ بالمائة من الزلزال الكبري في العالم. حيث يمتد هناك خط الانقطاع الصخري الفاصل بين الصفيحتين الكبيرتين الغربية وهي الهندية المحيطية والصفيحة الشرقية القارية اليوراسية-البورمية وهذه الصفيحتين في حركة دائمة بشكل بطيء، ونتيجة لحركة هاتين الصفيحتين بشكل مواز لبعض، فقد حدث نوع من التصادم والتضاغط الشديد بينهما نجم عن ذلك تصدعات مختلفة حيث انزلقت الصفيحة الهندية المحيطية الأكثر كثافة تحت الصفيحة اليوراسية-البورمية بسرعة ٦ سم في السنة تقريرياً لتولد زلزاً على عمق ١٠ كم تحت سطح المحيط الهندي وامتدت الحركة على فالق طوله ٤٠٠ كم في اتجاه الشمال الغربي بزاوية بلغت ٢٠ مترا على امتداد فالق. عندما اصطدمت الموجة بالشاطئ تحولت طاقتها الحركية إلى موجة عالية بلغ ارتفاعها أكثر من ١٠ أمتار.




**انزلاق الصفيحة الهندية المحيطية الأكثـر كثافة تحت الصفيحة اليوـراسيـة
البورمية شمال غـرب سومطرة بـسرعة ٦ سـم في السـنة تقريـبا**

بلغت الطاقة الكلية التي أصدرها زلزال المحيط الهندي حوالي 10^{32} جول وهذا تعادل تقريبا طاقة قنبلة بقوة مائة جيجا طن Gigaton وهذه ناتجة لانهيار صخري (3). وقد أدى زحف الكتلة الصخرية والطاقة الهائلة التي أطلقتها الزلزال إلى إحداث تغير طفيف في دوران الأرض . وتشير النماذج النظرية إلى أن يوم الأرض سيقصر بمقدار 2,68 أجزاء من المليون من الثانية (US 2,68) (أو حوالي واحد billionth من طول اليوم) وذلك نتيجة لنقصان في تفطط (oblateness) الأرض. كما قد يؤدي الزلزال أيضا إلى "تحلل" (Wobble) في حدود 2,5 سنتيمتر، أو ربما بحدود 5 أو 6 سنتيمترات . وبصورة مذهبة، تحركت بعض الجزر الصغيرة المتواجدة بسومطرة في بعض المناطق الجنوبية الغربية في حدود 20 م ، بل إن النهاية الشمالية لسومطرة التي تقع على صفيحة بورما ، قد تنتقل أيضا مسافة 36 م باتجاه الجنوب الغربي.

Tsunamis


موجات المد والجزر في الوطن العربي



حركة تسونامي سومطرة والتي تبين منطقه تصادم الصفيحة الهندية المحيطية من الغرب مع الصفيحة القارية / اليوراسية - البويرمية من الشرق بمعدل ٦ سم في السنة تقريبا. ويظهر في الشكل البؤرة السطحية لزلزال سومطرة الذي حدث في ديسمبر ٢٠٠٤ م.





لم تتضرر بنجلادش كثيراً بزلزال المحيط الهندي بالرغم من أنها تقع على الطرف الشمالي لخليج البنغال، علاوة على كونها أرض منخفضة، ويرجع السبب إلى أن اتجاه خط الفالق (الصدع) يمتد اتجاه شمال-جنوب، الأمر الذي جعل القوة العظمى للموجات التسونامية تسافر عمودياً على اتجاه خط الفالق، أي باتجاه شرق-غرب. دلت الدراسات الزلزالية التاريخية والحديثة على امتداد فالق سومطرة أن مثل هذا النوع من الزلازل وبقدر ٩ قد يتكرر كل ٢٣٠ سنة تقريباً والله أعلم.



الزلزال التسونامي التاريخية والحديثة المدمرة التي وقعت في إندونيسيا وبلغ مقدارها أكبر من ٧ ويظهر تغير معدل تصادم الصفائح على امتداد صدع سومطرة.

Tsunamis

موجات المد والجزر في الوطن العربي





المناطق التي غمرها التسونامي بعد ساعتين من حدوث الزلزال حيث شمل
اندونيسيا وมาيلزيا وتايلاند ويظهر السجل الزلزالي خلال تلك الفترة

Tsunamis



موجات المد والجزر تأثيرها على الوطن العربي



المناطق التي غمرها التسونامي بعد تسع ساعات تقريباً من حدوث الزلزال حيث شمال اندونيسيا ومالزريا وتايلاند والهند وسييريلانكا والماليزيا والصومال وسواحل البحر العربي ويظهر السجل الزلزالي خلال تلك الفترة

Tsunamis

موجات المد و المدحثة تأثيرها على الوطن العربي



منطقة باندا اتشيه الاندونسية التي دمرها التسونامي بالكامل ويلاحظ دلائل رفع أو غمر الشواطئ .




مدى تأثير ظاهرة التسونامي على الوطن العربي

تتأثر منطقة شبه الجزيرة العربية حركياً بالانفتاح في منطقة البحر الأحمر ثم منطقة التصادم غرب إيران ممتدة حتى صدع الأنضول الذي يأخذ الاتجاه من الشرق إلى الغرب في جنوب تركيا، هذا الصدع تحدث عليه حركة أفقية. أما منطقة البحر الأبيض المتوسط نجد أن الصفيحة التركية مع الصفيحة اليوراسية والصفيحة الأفريقية تتحركان حركة جانبية بالنسبة لكل منهما الآخر ولا يوجد تصادم في هذه المنطقة أما إلى الجنوب قليلاً في منطقة البحر الأبيض المتوسط يحدث تصادم وإن كان التصادم مازال في مرحلة المهد لا يقارن بالتصادم في منطقة المحيط الهادئ أو المحيط الهندي حيث تصطدم الصفيحة الأفريقية مع الصفيحة اليوراسية تحت القوس اليوناني والقوس القبرصي. معدل اندساس الصفيحة الأفريقية في هذا المكان حوالي ٢ سم لكل عام هو نفس معدل الانفتاح في البحر الأحمر بينما يصل المعدل إلى ٣ سم في منطقة تصادم الصفيحة العربية مع اليوراسية.

يتميز الخليج العربي بأنه بحر ضحل وشبه مغلق حيث يبلغ طوله ١٠٠٠ كم وعرضه من ٢٠٠-٣٠٠ كم ومساحته ٢٥٠٠٠ كم٢ ويصل أقصى عمق له ١٠٠ م. أما البحر الأحمر فيبلغ طوله ٢٠٠٠ كم ومساحته ٤٤٠٠٠ كم مربع وعرضه ٣٥٠ كم ويصل أقصى عمق له حوالي ٢٨٥٠ متراً ومتوسط العمق ٥٠٠ متر.



موجات المد والجزر تأثيرها على الوطن العربي



خارطة حركية تبين الصدوع النشطة في الوطن العربي وعلاقتها بالصفائح التكتونية العربية واليوراسية والأفريقية.

يتضح إن الظروف الحركية والبيئية التي تتشكل فيها التسونامي عموماً لا تتوفر في المنطقة العربية حيث أن ذلك يتطلب أولاً أن تكون منطقة بحار أو محيطات مفتوحة بآلاف الكيلومترات بالإضافة إلى أن مناطق التسونامي النشطة تتولد من حركة الدفع الفجائية التي يحدثها الزلزال تحت قاع المحيط نتيجة حركة تصدعية عنيفة من جراء تصادم صفيحتين. وفي بعض الحالات قد تنجم التسونامي عن ثوران بركاني أو سقوط نيزك أو حدوث انزلاق أرضي تحت الماء. علاوة على أن موجات التسونامي تميز بمدى طويل جداً لها القدرة على نقل الطاقة المدمرة من مصدرها في المحيط إلى مسافة تبلغ آلاف الكيلومترات.



إن ظروف تشكيل التسونامي لا تتوفر في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي نظراً لحدودية اتساعهم وضحلة أعماقهم علاوة على أن الفوالق في البحر الأحمر و خليج العقبة من النوع الرأسى والمضربي ليس لديها القدرة الكافية على توليد موجات تسونامية مدمرة كما هو الحال في المحيط الهادى. ولم يسبق تاريخياً أنه سجل أي موجات تسونامية منذ ٥٢٥ ق.م في شبه الجزيرة العربية.

أما الوضع في منطقة البحر الأبيض المتوسط فيعتبر أكثر قابلية وعرضة للزلزال التسونامية ويرجع ذلك إلى عرضه الكبير نسبياً، وكذلك إلى نوعية الصدوع في منطقة قبرص وما تحتها، المؤهلة لكي يتولد منها موجات تسونامية. حيث نجد أن محرك النشاط الزلزالي هي منطقة اندساس الصفيحة الأفريقيية تحت الصفيحة اليوراسية الواقعة تحت منطقة الأطلس في شمال أفريقيا من المغرب حتى تونس وتمتد أيضاً في البحر حتى شمال صقلية . الجدول ١ يوضح تسجيل تسعة تسوناميات في منطقة البحر الأبيض المتوسط منذ ٥٢٥ ق.م وخلو شبه الجزيرة العربية من هذا النوع من الزلازل.

وعموماً فإنه يمكن تخفيف مخاطر الزلزال وتصميم المباني والمنشآت المقاومة لها أما كوارث التسونامي فالوضع أصعب نسبياً في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر لأن زمن انتقال الموجة من المصدر إلى الشواطئ لا يكفي لبناء منظومة إنذار مبكر كما في المحيطين الهادى والهندي.



الزلزال التسونامي المؤثرة التي حدثت في الوطن العربي.

الوصف	السنة
زلزال وأمواج بحرية ومد زلزالي أدى إلى تدمير مدينة صور.	٥٢٥ ق.م
تعرضت صور إلى أمواج عاتية ومد زلزالي.	١٤٠ ق.م
أمواج زلزالية أدى إلى دمار واسع على طول ساحل شرق البحر المتوسط	٢٠٦ م
زلزال وأمواج بحرية دمرت بيروت تدميراً كاملاً وانحسرت مسافة ثلاثة كيلومترات وربما كان الأقوى في تاريخ المنطقة.	٥٥١ م
زلزال بقوة ٧,٣ أدى إلى أمواج عاتية وصلت إلى غور الأردن.	٧٤٦ م
أمواج بحرية عاتية دمرت مدينة عكا.	٨٨١ م
موجة من الزلزال والأمواج البحرية عصفت بقبرص وفلسطين وسوريا.	١٢٠١ م
أمواج بحرية عملاقة أحدثت دماراً على طول الساحل اللبناني.	١٤٠٤ م
أمواج بحرية ضربت شواطئ فلسطين.	١٧٥٢ م


تحفييف مخاطر التسونامي

من المعروف أن أكثر من ربع مجموع التسونامييات التي وقعت في منطقة المحيط الهادى منذ عام ١٨٩٥ نشأت بالقرب من اليابان نظراً لقربها من التقائه أربع صفائح حركية نشطة. ومن أجل هذا كرس اليابانيون أموالاً طائلة في محاولة للتنبؤ بالتسونامي والتقليل من آثارها. اشتمل برنامج تحفييف المخاطر في اليابان على:



- إعداد البرامج التعليمية والثقافية.
- إنشاء نظام فعال للإنذار المبكر.
- زراعة غابات اعتراضية شاطئية.
- إشادة مصادر بحرية.

وفي الدول النامية، تكون المعاناة من أثر الكوارث الطبيعية أشد وطأة، حيث أن أكثر من ٩٥٪ من إجمالي الخسائر في الأرواح الناجمة عن الكوارث تكون في الدول النامية، ويمكن أن يصل حجم الخسائر المادية التي تتسبب بها هذه الدول إلى ٢٠ مرة ضعف ما تتسبب به الدول الصناعية (كنسبة من إجمالي الناتج المحلي). وعلى مدى القرن الماضي ضرب اليابان ١٥٠ تسوناميًّاً أحدث ١٥٪ خسائر مادية وبشرية بينما أحدث أكثر من نصف عدد التسوناميات أقل ٣٤ التي ضربت إندونيسيا خلال القرن الماضي خسائر كبيرة في الممتلكات والأرواح.



أجهزة للكشف عن التسونامي في المياه العميقة في المحطاتزلزالية الواقعة على امتداد نطاق النشط زلزالي (المثلثات الزرقاء). تعتمد هذه الأجهزة على مجسات عالية الدقة توضع في قاع البحر (OBS) وعندما يستشعر أحد هذه المجسات موجة تسونامية فوقه، يبعث إشارات صوتية إلى منصة طافية على سطح الماء لتقوم بدورها بنقل التحذير عبر الأقمار الصناعية VSAT.



قامت الإدارة الأمريكية **NOAA** بتطوير شبكة تضم محطات رصد في أعماق المحيطات تسمح بتقديم التسوناميات والإبلاغ عنها فوراً ويعرف هذا المشروع باسم **DART** توضع الرادارات في قاع البحر وعند شعورها بموجة تسونامية فوقها تبعث إشارات ضوئية إلى منصة طافية على سطح الماء لتقوم بدورها بنقل التحذير عبر الأقمار الصناعية إلى المسؤولين عن إطلاق صفارات الإنذار.

في الوقت الذي يتعدى فيه إيقاف أمواج التسونامي والأعاصير، ثمة فرصة كبيرة لتخفييف وطأتها تمثل في التأهيل مثل هذه الكوارث من خلال مشاركة المجتمعات المحلية على نحو صحيح ووضع أنظمة بناء وتصميم منشآت ساحلية أفضل وتحسين طرق إدارة الشعب المرجانية وأشجار المانغروف.




تمتص أشجار المانغروف طاقة موجة التسونامي



"لقد بدأت الوكالات المانحة والحكومات تدرك أن التأهب للكوارث والتكيف مع التغيرات المناخية لا بد وأن يكون لهما الأولوية القصوى في مساعدات التنمية، ولا سيما في المناطق القرية من مستوى سطح البحر والأكثر عرضة لهذه الكوارث مثل جزر المحيط الهادئ".

والحقيقة أن تحقيق المقيمين في المناطق الساحلية المنخفضة بشأن علامات التحذير التي قد تشير إلى اقتراب حدوث موجة تسونامي (مثل الاهتزازات والانحسار المفاجئ للمحيط)، وإنشاء نظام إنذار يتضمن نشرات طوارئ وتحذيرات تبث على الهواتف، وصفارات إنذار، وتحسين أنظمة الاستجابة للطوارئ، كل ذلك كان من شأنه أن ينقذ العديد من قتلوا بسبب موجة التسونامي التي ضربت سواحل المحيط الهندي .



موقع أنظمة الإنذار المبكر بالتسونامي المحلية والإقليمية

Tsunamis

موجات المدود تأثيرها على الوطن العربي



نطاق مخاطر سونانية




إذا حدث زلزال، فالجأ إلى مكان مرتفع أو مكان بعيد عن الساحل



تؤدي توعية المجتمعات المحلية دوراً حاسماً لتفادي كوارث التسونامييات في المستقبل. وحالياً تنتشر لافتات موحدة في جميع الولايات المطلة على المحيط الهادئ لتحذير سكان السواحل في المناطق易受威胁的地区.

Numerical simulation of Tsunami inundation



Required Data



- Topography
- Coastal Bathymetry
- Land Cover (Surface Roughness)

نموذج محاكاة رقمية لفيضان التسونامي



الخلاصة

إن ظروف تشكيل التسونامي لا تتوفر في البحر الأبيض المتوسط والأحمر والخليج العربي نظراً لحدودية اتساعهم وضحلة أعماقهم وطبيعة ميكانيكية حركة الصفائح التكتونية ونوعية الصدوع بالإضافة إلى أن زمن انتقال الموجة من المصدر إلى السواحل قصير وبالتالي فإن هذا لا يكفي لبناء منظومة إنذار مبكر كما هو الحال في المحيطين الهادئي والهندي.

وحيث أن هناك العديد من المشاريع البحرية والجزر الاصطناعية على امتداد شواطئ الخليج العربي والبحر الأحمر فإنه من الضرورة إنشاء كاسرات أو مسدات الأمواج التي تعمل على تشتت الطاقة الموجية وانكسارها قبل وصولها إلى الشواطئ بمسافة ٢٠ متراً. وينصح بأن يتم التصميم الهندسي للمنشآت الحيوية والعمارية على امتداد شواطئ المنطقة العربية على اعتبار وقوعها في منطقة النشاط الزلزالي العالي **Zone 2A** وإعطائها معامل أمان زلزالي مرتفع نسبياً بحيث يكون لديها القدرة على تحمل زلازل ذات قدر زلزالي ٦ درجات.

المراجع

- (١) كونزاليس (١٩٩٩)، "تسونامي"، مجلة العلوم، الكويت، المجلد ١٥، العدد الثامن، ٤-١٣.
- (٢) العمري، عبدالله محمد (١٤٢٦هـ)، "طوفان تسونامي- الزلازل وسبل تخفيف مخاطرها"، مركز بحوث كلية العلوم، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، العدد الأول، ١-٣٠.
- (٣) خضر، أحمد (٢٠٠٦م)، "في الذكرى الأولى لكارثة تسونامي"، مجلة معهد الكويت للأبحاث العلمية، الكويت، العدد ٢٢، ٢٢-١٣٥.

